

薬剤師が開発！

添付文書改訂速報 配信サービス

忙しい業務中でも**変更箇所をすぐに把握**できる！

限られた時間・人員で効率的に働く

医薬品の添付文書の改訂箇所を確認しておくことは、薬剤師にとって大切な仕事の一つです。しかし、その改訂内容は、文字や表現方法等、多岐の修正情報が含まれています。更にその情報は、自店舗で取り扱いのある商品に限られているのではないのでしょうか。他の商品情報を確認したい場合、多忙な業務の合間をぬって、自ら情報を取りにいく労務を重ねるしかありません。

そこで、ティ辞書企画では、専任の薬剤師が病院や薬局でその時必要とされる、主要な改訂項目を選択し作成。週2回配信し、現場をバックアップします。

薬剤師だからできるわかりやすい補足つき！

情報の処理・共有が簡単！

週2回のメール配信

- 次の項目が改訂された場合に配信
警告、禁忌、効能・効果、用法・用量、重大な副作用
- 添付文書の主要な改訂を選択し、ポイントを絞りメール配信
- 重要な速報内容が Topics ですぐに把握
さらに薬の保管方法など、患者様に伝える必要のある項目もプラス。

Excel ファイルを添付

- 販売名コードを利用し、製剤とリンクしても利用できる

料金について

- 最低購入単位数は、1 メールアドレスからになります。
- 料金に関しましては、ティ辞書企画までお問い合わせください。
- こちらのサービスは、法人様対象となります。

サービスの提供イメージ

■ 配信される HTML メール（例）

添付文書改訂速報(2018年09月03～05日版)

【Topics】=====

- エビリファイの後発品に先発品の効能が追加
- オセタミビル:警告が大幅変更! 10歳以上の使用制限が削除

=====

【2018年09月03日】

20180903-001 ■レクサプロ錠10mg

<禁忌 変更>

モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤を投与中あるいは投与中止後14日間以内の患者(「相互作用」の項参照)

↓
モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤(セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩)を投与中あるいは投与中止後14日間以内の患者(「相互作用」の項参照)

20180903-002 ■アモリンカプセル125/250/ベストコール静注用0.5g/1g/アジスロマイシン錠250mg「CHM」

<効能・効果に関連する使用上の注意 追加> *2018年3月27日使用上の注意の改訂指示による

咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、感染性腸炎、副鼻腔炎に対する注意が追加されました。

使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。

改訂の理由を補足説明

【2018年09月04日】該当なし

【2018年09月05日】

20180905-001 ■アリピプラゾール錠3mg「サワイ」、他6品目

<効能・効果 追加> *先発品 エビリファイに合わせた追加

・双極性障害における躁症状の改善

改訂の理由を補足説明

20180905-002 ■オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」/オセルタミビルDS3%「サワイ」

<警告 削除>および<重要な基本的注意 変更> *2018年8月21日使用上の注意の改訂指示による

10歳以上の未成年の患者における使用の文章が削除になりました。また、異常行動に関する注意喚起の文章が、重要な基本的注意の項に変更になりました。

改訂の理由を補足説明

<重大な副作用 変更> *2018年8月21日使用上の注意の改訂指示による

精神・神経症状

↓

精神・神経症状、異常行動

改訂の理由を補足説明

■ テキスト提供の内容を Excel でも提供（例）

速報日	改訂日	販売名コード	速報内容
			【2018年09月03日】
			■レクサプロ錠10mg
			<禁忌 変更>
20180907	20180903	1179054F1022	モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤を投与中あるいは投与中止後14日間以内の患者(「相互作用」の項参照)
			↓
			モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤(セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩)を投与中あるいは投与中止後14日間以内の患者(「相互作用」の項参照)
			■アモリンカプセル125/250/ベストコール静注用0.5g/1g/アジスロマイシン錠250mg「CHM」
			<効能・効果に関連する使用上の注意 追加> *2018年3月27日使用上の注意の改訂指示による
20180907	20180903	6131001M1029	咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、感染性腸炎、副鼻腔炎に対する注意が追加されました。
			使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。
20180907			【2018年09月04日】 該当なし
			【2018年09月05日】
			■アリピプラゾール錠3mg「サワイ」、他6品目
			<効能・効果 追加> *先発品 エビリファイに合わせた追加
20180907	20180905	1179045F1074	・双極性障害における躁症状の改善
			■オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」/オセルタミビルDS3%「サワイ」
			<警告 削除>および<重要な基本的注意 変更> *2018年8月21日使用上の注意の改訂指示による
20180907	20180905	6250021M1035	10歳以上の未成年の患者における使用の文章が削除になりました。また、異常行動に関する注意喚起の文章が、重要な基本的注意の項に変更になりました。
			<重大な副作用 変更> *2018年8月21日使用上の注意の改訂指示による
			精神・神経症状
			↓
			精神・神経症状、異常行動